

Ficha Técnica AGICRON 10WP

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: AGICRON 10WP

Nome Comum: Acetamiprido

Categoria: Pó molhável

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0078

Composição química: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

COMPOSIÇÃO:

ACETAMIPRIDO.....10% p/p
Inertes (antiaglomerante, alcanilizante, atenuador de espuma, estabilizante, tensoativo e atrativo) 90% p/p

INDICAÇÕES DE USO: AGICRON 10WP é um mosquicida em pó molhável, elaborado com Acetamiprido, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo indicado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar, como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

INSTRUÇÕES DE USO:

PULVERIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 800mL de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 50 m².

PINCELAMENTO EM PLACAS OU NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água. Fazer o pincelamento em áreas de aproximadamente de 10 x 30 cm que serão suficientes para cobrir uma área de 100 m² (ou seja 80mL de calda cobrem uma área de 100 m²). Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, chapa de madeira ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas.

PARA APLICAÇÃO USANDO CORDÕES PLÁSTICOS OU BARBANTES: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos.

Importante: Se necessário, reaplicar após uma semana. Evite aplicar o produto em superfícies sujas, porosas ou com pinturas novas a base de cal, pois o seu efeito residual poderá ser reduzido. Efeito residual de 4 a 8 semanas.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto 6 horas ou após secagem. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Não aplicar o produto em superfícies de processamento, manipulação ou embalagem de alimentos.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o. Contatar a empresa fabricante para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tripla lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Inutilize a embalagem vazia perfurando o fundo e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Neonicotinóide

Nome Comum: Acetamiprido

Antídoto/Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICADO POR:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018