

Ficha Técnica ATTAMIX 2P GOLD

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: ATTAMIX 2P GOLD

Nome Comum: Deltametrina

Categoria: Inseticida Pó

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0044

Composição química: (S)-_cyano-3-phenoxymethyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

COMPOSIÇÃO:

Deltametrina0,2% p/p

Inertes(Veículo).....100% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

É um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides felis*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*) e barata alemã (*Blattella germanica*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem / Área g/ m ²
Baratas	50/10
Pulgas	50/10
Formigas	50/10

Aplicar INSETICIDA ATTAMIX 2P GOLD diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na proporção de 50g/10m² de área. Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas.

-Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

RECOMENDAÇÕES:

-Evitar o contato manual com o produto.

-Não aplicar em dias chuvosos ou em solo úmido.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

-Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento Sintomático

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018