

Ficha Técnica BIOINSET 800 SC

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: BIOINSET 800 SC

Nome Comum: Fipronil e Imidacloprido

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0040

Composição química: Fipronil: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

COMPOSIÇÃO:

FIPRONIL1,75 % p/p
IMIDACLOPRIDO7,50 % p/p
Dispersante, Espessante, Umectante, Atenuador de espuma,
Conservante, Emulsificante e Veículos.....90,75% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com FIPRONIL + IMIDACLOPRIDO, que associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (*Nasutitermes sp.*), cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*), formiga cortadeira (*Atta spp*), formiga faraó (*Monomorium floricola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*) e aranhas (*Loxosceles gaucho*), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil, estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Cupins: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Preparar a calda diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Após o preparo da calda, aplicar 5 litros de calda para cada metro linear.

Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Baratas:

(*Blattella germanica*): Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

(*Periplaneta americana*): Diluir 100 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos, frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.

Aranha: Diluir 200 ml do BIOINSET 800 SC em 10 litros. Aplicar a calda em uma área de 200 m², nos locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. -Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. -Não fumar ou comer durante a aplicação. -Não reutilizar as embalagens vazias. -Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas, crianças e animais domésticos. -Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. -Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. -Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente. -Visando reduzir a probabilidade de exposição, e garantir melhor eficiência do produto, realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a necessidade de aplicação por todo ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. - Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. -Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. - Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol/ Neonicotinóide

Nome Comum: Fipronil / Imidacloprido

Antídoto/Tratamento: Tratamento Sintomático e Não há antídoto específico.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018