Ficha Técnica RATICIDA - RATOKILL PÓ

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: RATICIDA - RATOKILL PÓ
Nome Comum: Cumatetralil
Categoria: Raticida Pó
Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0039
Composição química: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin.

COMPOSIÇÃO:
Cumatetralil 0,75% p/p, Benzoato de Denatônio 0,001% p/p, Agente Antiaglomerante, Corantes e Veículo.

INDICAÇÕES DE USO:
RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de CUMATETRALIL, sendo eficaz no controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

INSTRUÇÕES DE USO:
-Produto pronto para uso, pó de contato para ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor ao entrar em contato com RATOKILL PÓ, terá este aderido ao pelame e, na tentativa de limpar-se acabará ingerindo o pó.
-Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.

PRECAUÇÕES:
-CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! -CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. -Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. -Não fumar ou comer durante a aplicação. -Manter o produto na embalagem original. -Não reutilizar as embalagens vazias. -Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. -Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. -Durante o manuseio, usar luvas e evitar o contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar. -Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. -Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. -Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. -As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. -Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. -Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. -Não se deve contaminar os cursos de água. -Raticida RATOKILL é um rodenticida DOSE ÚNICA.

PRIMEIROS SOCORROS:
-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. -Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. -Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. -Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. -Em caso de ingestão não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:
Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.

ARMAZENAMENTO:
Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e ao abrigo da luz solar.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Cumatretalil
Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000
Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018