Ficha Técnica

REV 08 01/02/16

RI DO RATO® PÓ DE CONTATO

1-Nome Comercial: RI DO RATO® PÓ DE CONTATO

2-Composição:
Warfarin..... 1% (p/p)

3-Fórmula Molecular:

$C_{19}H_{16}O_4$

4-Formulação
Pó de contato hidrorepelente

5-Apresentação:
Embalagem de 1Kg

6-Toxicologia:
DL50 oral aguda para ratos - Ativo.....58-166 mg i.a./Kg;
DL50 oral aguda para camundongos - Ativo.....374 mg i.a./Kg;
DL50 oral aguda para gatos - Ativo.....20-50 mg i.a./Kg;
DL50 oral aguda para cães - Ativo.....6-40 mg i.a./Kg.
Classificação toxicológica: Classe III - Warfarin

7-Mecanismo de ação:
RI DO RATO PÓ DE CONTATO - Anticoagulante, age como antagonista da vitamina K1 necessária à produção dos fatores de coagulação II, VII, IX e X, sintetizados principalmente no fígado. O animal lambe seus pêlos durante sua limpeza, ingerindo o pó de contato. Após ingerir uma quantidade suficiente do produto, apresenta hemorragia interna e externa progressiva até a morte.

8-Indicações de uso:
RI DO RATO PÓ DE CONTATO - Raticida anti-coagulante de doses múltiplas, é indicado no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Pode ser aplicado em residências, indústrias e comércios.

9-Modo de usar:
RI DO RATO PÓ DE CONTATO - Polvilhar o produto, em faixas de 5 a 10cm de largura, nos locais onde os roedores vivem e transitam, tais como: trilhas, túneis, rodapés, cercas, etc. Em locais onde crianças e animais possam ter acesso, recomenda-se colocar o produto em caixas porta iscas. Essas caixas funcionam como ponto de esconderijo de roedores, além de proteger contra as intempéries e o acesso de animais não alvo.



- **HIDROREPELENTE**
- **BAIXO CUSTO**
- **FRASCO APLICADOR**

Colocar as caixas porta iscas ao longo das trilhas e próximas aos rodapés com distância de 5 a 10m uma da outra. Não utilizar o produto em locais onde há a manipulação de alimentos, evitando a contaminação dos mesmos. Os pontos de aplicação devem ser inspecionados após 2 ou 3 dias, para verificar a necessidade de nova aplicação ou remanejamento de caixas.

10- PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não comer ou fumar durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Evitar contato com a pele e os olhos.
- Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Não jogue no fogo ou incinerador.
- Pode ser fatal se ingerido.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saude, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

11- Sinais e Sintomas de Intoxicação:
Pequenos pontos avermelhados na pele, hematomas, presença de sangue na urina e fezes, sangramento nasal, sangramento nas gengivas e vagina.

12 - Armazenagem:
Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

13- Vazamento Acidental:
Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e com auxílio de uma pá, recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

14- Eliminação e Descarte:
As embalagens devem ser encaminhadas ao posto de recebimento de embalagens credenciado pelo fabricante.
Para maiores informações, acesse o site da ABAS: www.as.org.br/embalagem.htm

15-Primeiros Socorros:

- INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- PELE: No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- INALAÇÃO: No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

16-Instruções para uso médico:

Grupo Químico: Cumarínico
Nome Comum: Warfarina
Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 / Tratamento Sintomático
Telefone de Emergência 24 hs: 0800 014 11 49

Registro no M.S 3.0425.0120.001- 2

Fabricado por:
Rogama Indústria e Comércio LTDA
Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964
CEP: 12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP
CNPJ: 90.821.554/0003-04
Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br
e-mail: sac@rogama.com.br
SAC: (12) 3644-3030



ROGAMA

CERTIFICADA
NBR ISO 9001:2008

Mais que produto. Suporte e garantia.